

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE LOTTA OBBLIGATORIA

(decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite")

**La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:**

- 1) si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia;  
in inverno si estirpano le ceppaie comprese le radici;**
- 2) si elimina l'insetto che la trasmette.**

**TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2016**  
contro l'insetto *Scaphoideus titanus*, vettore della malattia

**TRATTARE NELLE DATE CHE SARANNO INDICATE  
DALL'ASSISTENZA TECNICA O DAI COMUNI**

**ATTENZIONE!! E' INUTILE TRATTARE PRIMA CHE L'INSETTO NON E'  
ANCORA INFETTIVO**

### SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

### ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione; trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

## **AZIENDE BIOLOGICHE**

**ATTENZIONE: I TRATTAMENTI CON PIRETRO e SALI POTASSICI DEGLI ACIDI GRASSI SONO EFFICACI SOLO SUI GIOVANI E QUINDI DEVONO ESSERE ANTICIPATI RISPETTO A QUELLI CON INSETTICIDI DI SINTESI E RIPETUTI 3 VOLTE A DISTANZA DI 7-10 GIORNI, EVITANDO COMUNQUE DI TRATTARE NEL MOMENTO DI FIORITURA DELLA VITE**

**Il PIRETRO deve comunque essere utilizzato per due trattamenti.**

**Trattare la sera tardi, usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7).**

**AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA** (aziende che aderisco alle Misure Agroambientali PSR 2014-2020)

**BUPROFEZIN** (da utilizzare solo negli stadi giovanili)

**ETOFENPROX**

**ACETAMIPRID**

**THIAMETHOXAM**

**CLORPIRIFOS ETILE** (da non utilizzare oltre il 30 luglio)

**CLORPIRIFOS METILE**

**PIRETROIDI** (1 solo trattamento all'anno, da utilizzare solo in prossimità della vendemmia, pre o post vendemmia)

**ALTRE AZIENDE**

**PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE (ELENCO A)**

| ELENCO A           |                     |                              |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Sostanza attiva    | Gruppo chimico      | Intervallo di sicurezza (gg) |
| Buprofezin         | Tiadiazinoni        | 21                           |
| Etofenprox         | Fenossibenzil eteri | 14                           |
| Clorpirifos etile  | Fosfororganici      | 30                           |
| Clorpirifos metile | Fosfororganici      | 15                           |
| Acetamiprid        | Neonicotinoidi      | 14                           |
| Thiamethoxam       | Neonicotinoidi      | 21                           |
| Acrinatrina        | Piretroidi          | 30                           |
| Alfa-Cipermetrina  | Piretroidi          | 7                            |
| Beta-ciflutrin     | Piretroidi          | 14                           |
| Deltametrina       | Piretroidi          | 3-7-15                       |
| Esfenvalerate      | Piretroidi          | 14-15                        |
| Lambda-cialotrina  | Piretroidi          | 7-9-21                       |
| Zeta-cipermetrina  | Piretroidi          | 28                           |

(\*) sostanze attive con azione indipendente dalla temperatura o efficaci anche con temperature elevate

## **SANZIONI**

**CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 200,00 A 1.200,00 EURO**